

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 23-6-76213041

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - 45400 FLEURY LES AUBRAIS

Téléphone : 86-36-24

Commission Paritaire de Presse n° 530 AD

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F

M. le Sous-Régisseur de recettes
de la Protection des Végétaux
93, RUE DE CURAMBOURG
45400 FLEURY LES AUBRAIS
C. C. P. : La Source 4604-25 C

BULLETIN TECHNIQUE N° 102

21 JUIN 1976

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

ARBRES FRUITIERS

Le traitement conseillé dans notre bulletin du 31 Mai arrive en fin d'efficacité et les conditions climatiques ont été très souvent favorables à l'activité des papillons et aux pontes.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement dans les prochains jours.

PUCERONS - PSYLLES - ACARIENS

Les indications données dans notre bulletin du 17 Juin restent toujours valables.

Il y a lieu d'être particulièrement vigilant pour intervenir le cas échéant en utilisant un produit également efficace contre le carpocapse.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

En raison de la sécheresse persistante, les risques de contaminations primaires par ascospores ne sont pas terminés.

Il est donc conseillé de profiter du traitement dirigé contre le carpocapse pour ajouter un produit efficace contre les tavelures.

TORDEUSE DU POIS

CULTURES LEGUMIERES

Les indications données dans notre bulletin du 31 Mai restent toujours valables.

Un traitement peut être effectué sur les cultures tardives à la formation des premières gousses. On peut utiliser l'une des matières actives suivantes : DIETHION (1 000 g/ha) - PHOSALONE (600 g/ha). Ces deux insecticides également efficaces contre le puceron vert du pois sont reconnus non dangereux pour les abeilles et leur délai d'emploi avant récolte est de 15 jours.

MILDIOU

VIGNES

En raison de la sécheresse persistante, aucun traitement n'est à envisager actuellement contre cette maladie. Le concours pour la détection des foyers primaires de mildiou reste toujours ouvert.

OIDIUM

Nous rappelons encore une fois qu'il est important d'effectuer un poudrage anti-oidium pendant la floraison.

BLACK ROT

Les indications données dans notre bulletin du 17 Juin restent toujours valables.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles
G. RIBAUT - B. LELIEVRE

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription phytosanitaire "CENTRE"
G. BENAS